

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百九十二

詳校官太醫院醫官臣袁大錫

編修臣倉聖脉覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十二 明

周王朱橚 撰

嬰孩癖積脹滿門

乳癖

附論

夫小兒脾胃氣弱保養不慎則令三焦不調乳飲不化聚而成痰流於脇下寒氣乘之遂成癖聚久而不消橫連少腹上至心下按之苦痛肌膚漸瘦面色青黃多睡目溢寒熱往來嘔吐欬嗽故謂之乳癖世呼為妳脾是

也 小兒乳癖者由乳母食飲無常醉飽過度即乳兒不知樽節小兒脾胃虛嫩不能消化或乳母偏卧一向乳兒不能迴轉兒亦睡着母滯偏於脇下因茲結成塊而痛者是也其候面色青黃發渴壯熱吐乳多睡口内生瘡腹脹筋青時或渴飲漸漸黃瘦腹中結塊不散故名乳癖也 小兒生下中寒遍身發黃昏睡小便赤黃體微蒸熱此候本因胎熱又因哭不消化遂為妳積所治者先用牛黃散調中飲二藥與服如仍見黃色眼睛

直視氣喘魚口手曲拳惡候不治 此患先解利後取
積次調胃氣無悞矣又云先用惺惺丸次取銀白散調
氣

方

人參丸

如幼
新書

治小兒乳癖手脚心熱面色青黃不下乳

食日漸羸瘦

人參

去蘆
頭

生薑

切乾
炒

桂心

川大黃

剉碎
各半兩
微炒

赤

茯苓

白朮

枳殼

炒黃
去瓢

檳榔

木香

當歸

微
炒

荆三稜

微煨 剉

鼈甲

醋炙黃 去裙襖

右為末煉蜜和丸如菉豆大一歲以粥飲下三九日

三服看兒大小以意加減

牽牛丸

聖濟總錄

治小兒疳癖腹脇緊硬時作寒熱

白牽牛

末二錢

粉霜

一錢

膩粉

三錢

硃砂

研一錢半

黃鷹屎

末一錢

白丁香

為末一錢

石燕子

搗研一錢

延胡索

大者七枚搗末

白麴

錢沒藥

研

白滑石

末各一錢

右為細末拌和勻滴水和作餅子先於火上炙乾次

入炭火煨熟為度放冷細研更入硫黃一錢同研勻
滴水和為丸如菴豆大量兒大小每服三九至五九
煎柳梅柿湯下臨卧服

鼈甲九

聖惠方

治小兒乳癖面色黃瘁食乳微少日漸羸

瘦

鼈甲

醋炙黃
去裙襴

荆三稜

微煨
剉

檳榔

各半
兩

人參

去蘆
頭

赤

茯苓

白朮

木香

枳殼

麩炒微
黃去瓢

當歸

微炒

桂心

各一
分

川大黃

一兩剉
微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲研下三九日再服以利為度更量兒大小以意加減

水銀丸

幼幼新書

治乳癖積熱發疳

水銀

結砂一錢

硃砂

白丁香

各半錢

腦子

輕粉

各少許

香墨

鷹屎巴豆

醋煮今乾

青黛

羅過

百草霜

黃明

膠

用蛤粉炒黃色各一錢

右為末滴水丸如菉豆大薄荷湯下三五丸量大小加減

惺惺丸

新書 幼幼

治小兒虛積及實積乳癖

白丁香

硃砂

錢各一

陽起石

分一

黃鷹屎

錢二

輕粉

錢一

麝香

許少

硃砂

醋化一字

黃連

分七

續隨子

殼出油

石燕

子

五箇醋淬
煨七次

右為末浸蒸餅丸如黍米大每服三十九丸量兒大小

加減皂子并葱白煎湯臨卧服

木香丸

方 聖惠

治小兒乳癖不消心腹滿悶

木香

荊三稜

微煨

檳榔

青橘皮

浸去白

人參

去蘆頭

赤茯苓

牽牛子

炒

草豆蔻

去皮各半兩

郁李仁

一兩浸去皮微炒

右為末以醋煮麪糊為丸如麻子大每服以粥飲下
三九量兒大小加減服之

硃砂丸

聖濟總錄

治乳癖

硃砂

礞石

粉霜

鷹屎

無食子

荊三稜

各用末一錢七分

膩粉

三字

龍腦

研一字

右同研勻以麪裏煨熟取棗肉和藥丸如棗豆大每

服三九或五九古老錢湯下量兒大小加減兼治久積

次用外貼藥

外貼散

聖濟總錄

治乳癖

芸薹子

末三錢

寒食麪

一錢半

右同研勻用新水調如糊紙上攤貼乳上頻以水潤之

聖餅子

聖濟總錄

治虛中挾積并乳癖

石燕子

末二錢

粉霜

三錢

膩粉

研各二錢

白麪

四分

砂

研一錢

延胡索

一分為末

鷹屎白

研一錢

右為末鷄子和丸如鷄頭作餅子煨灰火內微燒過

每服米飲化下半餅子

輒金丸

新書

治小兒虛積乳癖

膩粉

二錢

蓬砂

研皂子大

黃連

去鬚半錢

礞砂

研皂子大

粉霜

半錢

黃

鷹屎

半錢

巴豆

一枚半生半燒

太陰玄精石

研半錢

右為末再同研勻棗肉和用麪劑裏文武火中煨以

麪熟為度去麪取藥旋丸如黃米大每服一二九甘

草薄荷湯下量兒大小加減

大黃丸

聖濟總錄

治小兒初生至百日週歲腹內有氣衝心

喉及壯熱頭疼嘔逆腹疼寒熱乳癖宜下胎中宿物

大黃

剉炒

丹砂

研

人參

枳殼

去瓤麩炒半錢

柴胡

去苗桂

去粗皮各半分

木香

一分

白茯苓

去黑皮一分半

右為末煉蜜丸如棗豆大每服五丸乳汁下日三服

大者加至二十九

大黃丸

幼幼新書

治小兒乳癖脇下堅硬大便難小便赤

川大黃

剉碎
微炒

訶梨勒皮

各半
兩

烏梅肉

微炒

陳橘皮

浸
去

白熟
焙

木香

各一
分

郁李仁

浸去皮
微炒

川朴硝

各三
分

桔梗

一分去
蘆頭

右為末煉蜜和九如菜豆大一歲兒每服以粥飲研下五九晚後再服更量兒大小以意加減

治嫺癖

訶子

五箇唐
去兩尖

密陀僧

二錢

硫黃

輕粉

白丁香

黑丁香

粉霜

硼砂

各一
錢

右為末每服半錢男用女兒乳汁化服女用男兒乳

汁化下

二香散

聖濟總錄

治小兒乳癖

密陀僧

研

硃砂

研各三錢

硫黃

研三錢

石燕子

一枚搗研

白丁香

香

直者四十九枚

丁香

二十一枚為末

膩粉

炒二錢七研

右同研勻為細散每服一歲半錢七二歲一錢七十

歲已上二錢七用麪湯下如左肋下病卧左邊右肋

下病卧右邊至曉取下癖積是驗

水銀九

聖濟總錄

治小兒乳癖脇肋堅硬喘麤時作痛

水銀

錢一

硫黃

二錢同研

膩粉

三錢

蜜陀僧

二錢搗研

硃砂

研半錢

石燕子

搗研二錢

巴豆

二粒去皮膜心研出油盡

右為末研勻白麪糊為丸如黃米太每服三九煎槐葉湯下乳食後臨卧服更量兒大小加減

滴水丸

聖濟總錄

治小兒乳癖

黃蘗

去粗皮剉

輕粉

研

巴豆

十粒去皮出油盡

水銀

結砂子半皂子大

丹砂

研

天南星

半夏

生薑汁浸一宿湯泡去滑培各一錢

右為末再同研勻滴水和丸如菴豆大每服二九或

三九煎生薑葱白湯下量兒大小加減服之

妙應丸

一名應丸

治小兒乳癖積聚按之若痛肌膚漸瘦面

色黃青

方見本門諸癖結脹滿類

枳殼丸

一名調中丸出幼幼新書

治小兒乳癖嘔吐脹滿寒熱

枳殼

麩炒微黃去瓢

木香

赤茯苓

各半兩

人參

去蘆頭

柴胡

去苗各三分

桂心

一分

川大黃

一兩到碎微炒

右為末煉蜜和丸如菴豆大每服以溫水化破三九

日三服量兒大小加減

治小兒乳癖

新書 勿勿

白丁香

黑丁香

各二十箇

石燕子

舶上硫黃 寒

水石

蜜陀僧

各三錢

膩粉

兩箇

右為末每服一錢用第二遍米泔水調服即取下病

如未下更一服

三稜散

新書 勿勿

治小兒乳癖結實不瘥

荊三稜

炮剉 碎

赤茯苓

當歸

洗焙 乾

鼈甲

醋炙黃去 裙爛各一

兩
枳殼

去瓢 麩炒

白朮

木香

各半 兩

右為細散每服一錢水一盞入生薑七片煎至五分

去滓放溫時時與服

揆癖丸治乳癖穀癥腹中塊痛

代赭石

大煨 醋淬 研十分

青皮

去白

木香

蓬朮

五靈脂

北黃

各三分

巴豆

壓去油 盡一錢

右為末醋麩糊為丸麻子大每服二丸食後擦薑泡

湯下

積氣散

聖濟總錄

治小兒乳癖

粉霜

研

硫黃

研各一錢半

蜜陀僧

研五錢

白丁香

研二錢

荊

三稜

為末七錢

右搗散再研勻每服一錢生薑漿水調下後五更服

青靈丸

青靈丸

聖濟總錄

治小兒乳癖

粉霜

丹砂

研

膩粉

各一錢

水銀

二錢用鉛少許結砂子

麝香

研半錢

青黛

二錢

巴豆

三十粒去皮心膜出盡油研

右各細研再同和勻麪為丸如黃米大薄荷湯下五
九至七九新水亦得

三稜散

幼幼新書

治小兒乳癖結實或有滯惡積不散令兒

日漸羸瘦面色萎黃春夏多發不欲食乳

荊三稜

微煨到

川大黃

到碎微炒

檳榔

鼈甲

醋炙黃去裙襴

赤

茯苓

各半兩

枳殼

一分麤炒微黃去瓢

右為散每服一錢以水一小盞煎五分去滓分為二
服日三四服下惡物為效

硃砂丸

新書 幼幼

治小兒乳癖壯熱體瘦

寒水石

龍腦

各細研

膩粉

檳榔

末各一錢

硃砂

半兩細研

飛過雄黃

細研一錢半

右同研令勻煉蜜和丸如菉豆大三二歲兒生薑湯下三九日再服量兒加減

化癖丸

新書 幼幼

治小兒乳癖結塊久不消化

巴豆霜

半兩兩

膩粉

硃砂

細研各一錢

黃鷹屎

一分硃砂

雄雀糞

各一字

右同研如粉用糯米飯和丸如黍米大一歲兒每服
空心煎皂莢仁湯下二丸取下惡物為度

軟銀丸

幼切
新書

治小兒乳癖

水銀

結成
砂子

白丁香

末

膩粉

各一
錢

鷹屎

末一
錢

續隨子

四十九
箇去殼

巴豆

二十一箇去心
膜研畧去油

右同研勻棗丸如棗豆大一歲一丸溫水下

銀白散

幼切
新書

生胃氣取下後宜服

人參 茯苓

甘草

炙

白朮

炒

白扁豆

去
皮

藿香葉

右各等分為末每服一錢紫蘇湯調下

如聖散

幼幼新書

治小兒乳癖發寒熱飢瘦不思飲食日漸

黃瘦欲成一切疳

硃砂

錢一粉霜

一字半

蜜陀僧

半兩

大丁香

二十箇

白丁香

四十箇全者

舶上硫黃

二錢半

右為末每服半錢冷麪湯下日一服正午時見效三

歲已上每服半錢三歲已下每服一字一方無大丁

香男病女乳女病男乳調後用通膈泄

銀粉九

一名木香
真珠九

治小兒乳癖潮熱驚涎宿食食作肚

痛及治腹脹取虛中積行滯氣

方見本門
積聚類

消堅九

全嬰方

治小兒乳癖及下塊爛消痰退熱膈實取

積

硃砂 輕粉

巴豆

去油各
一錢

阿膠

炒半
兩

好墨

許少
水

銀

二皂子大
結成砂子

右為末白飯為丸如小菴豆大三歲三九皂子泡湯

送下食前服一方用倒流水下

燒青丸

一名煉青丸
出幼幼新書

治小兒乳癖每至午時作寒熱微

有咳嗽脇肋癖硬

輕粉

二錢

太陰玄精

研一分

粉霜

硃砂

研各一兩

右再同研細水滴和為餅子以文武火燒熟為度再
研滴水丸如黃米大三歲已上每服五丸漿水下
三歲已下以意增減或飯飲下錢氏加白丁香真者
一字定粉一錢半同研此方至天明取下惡物是效
如爛癖未消盡隔三兩日又一服癖消為度

金花散

聖濟總錄

治小兒乳癖神效

白丁香

真者微炒七十粒

丁香

十五粒二味為末

蜜陀僧

研

硫黃

研

黃鷹屎白

研各半錢

右合研勻每服三歲已下一字三歲已上半錢並用

乳汁調臨卧服至來日取下青黑稠粘物即愈未盡

再服

化癖丸

聖濟總錄

治小兒乳癖肌瘦寒熱脇下硬痛

丹砂

研

生薑

切片晒乾為末各二錢

巴豆霜

一字半

硃砂

研

白

滑石

研各
二錢

右同研勻粟米飯和為丸如黃米大每服二九薄荷
湯下痢食後臨卧服

治小兒痢癖

幼幼
新書

蜜陀僧

訶子

丁香

荳蔻

木香

各等
分

右研羅為細末入膩粉少許再研每服一錢半米飲
下如不動來日再服立效

如神散

聖濟
總錄

治小兒乳癖攻脇肋緊痛

獨頭蒜

研 一顆

樓葱

研 一寸

膩粉

半錢

凌霄花

末一錢

右同研勻調塗脇肋上硬處用醋麪餅子貼蓋之候口聞蒜氣急用溫湯洗去

硫黃散

聖濟總錄

治小兒乳癖

硫黃

研

蜜陀僧

別研

膩粉

研

訶梨勒皮

為末各一錢

右和令勻每服一錢乳汁調下更量兒大小加減

又方

幼幼新書

黑丁香

二十箇

舶上硫黃

半兩

白丁香

五箇

蜜陀僧

半兩

右為細末如一歲者只一字臨卧服三兩歲者服半錢用乳汁如男兒用左乳汁下女用右乳汁下

二丁丸

金嬰方

治小兒乳癖在於兩脇下或左或右如狗

舌之狀令兒面黃腹大潮熱多渴日中啞煎夜間多哭

丁香

半錢

白丁香

一兩

蜜陀僧

輕粉

各一錢

右為末糊丸如小豆大三歲五九水下惡物下為效

消癖丸

聖濟總錄

治小兒乳癖積塊

牽牛子

一兩半
生半炒

皂莢

肥者二個燒
令煙盡為度

巴豆

去皮心研
出油夏秋

半兩春
冬一兩

右除巴豆外搗末後入巴豆再同研勻用粟米飯丸如菜豆大每服三九橘皮湯下如常服丸如粟米大茶湯下三九量兒大小加減

又方

新書
幼幼

治小兒乳癖羸瘦危困脇下硬有形

寒食麪

一錢半

汞

半錢

青礞石

末半兩

右研令勻以乳汁和分為二十餅子熨汁止以慢火

燂乾一餅子分為四處為飲食化服四分之一隔日一次服八服取效未能吃得飲食者化如糊紙在口

內

治小兒爛癖

幼幼新書

芫花

一兩醋浸三日淨洗

大黃

半兩為末 蒜一斤

右研同藥末研爛令勻男左女右用藥塗在乳母手

心熨擦癖上時聞患人口中如有藥氣即止立效

治爛癖

海上名方

丁香

二十粒

蜜陀僧

生硫黃

各半錢

右為細末每服半錢大者一錢米飲下隔一宿取黑物效

蓬莪茂散

聖濟總錄

治小兒脾胃氣弱乳食不化乳食留於

脇下因寒成癖

蓬莪茂

炮半兩

阿魏

一錢水化開浸蓬莪茂一宿慢火炒乾

右為細散每服半錢米飲調下量兒大小加減

膩粉丸

金嬰方

治小兒乳癖脇下結塊不消面黃發熱

膩粉

錢雄雀糞一分
微炒

右同研令勻以棗肉和丸如粟米大每服以新汲水
下一丸取下粘滯惡物為效量兒虛實大小以意加
減一方糊丸熟水下癖塊消即效

治未滿月小兒妳癖

幼幼
新書

紫河車 人參

右各等分為末用妳醋調作餅子如大錢大如左畔
有妳癖者藥貼左畔脚心用緋綿托乾後見效左右

一般使藥

治小兒妳癖

幼幼新書

紫河車

二兩

寒食麪

右同為末每用一匙許水塗足心病在左塗左病在右塗右塗於紅帛上縛之良久其病大便中下大便後盡洗去

又方

聖濟總錄

治小兒妳癖

白芥子 薑子

各等分

右為末水調攤紙上貼妳癖又用醋麪餅子蓋之立效少頃急去如不急去即成瘡

治小兒乳癖

聖濟總錄

用獨窠蒜一頭搗爛看兒乳癖大小候兒睡着隨病小大貼之兒腹內作聲便急取去不用

青皮丸

幼幼新書

治小兒妳癖脾疳瘦盡

用青皮不拘多少去白乾用為細末豬膽丸如菜豆大每服五九七九任意湯下日進三服

治小兒妳癖

幼幼新書

用蜜陀僧不拘多少研極細大蒜自然汁調稀稠得所塗於有妳癖處隨其小大周遍又不可塗之太過須臾候兒口中有蒜氣息即是藥透好細以手揉之覺妳癖似消及五六分即使用溫漿水洗去切須測度不可令消盡恐藥毒損氣也如未消藥先乾即別使溫水潤之

治小兒妳癖

幼幼新書

用紫河車不拘多少為末每服一錢冷水調貼癖
痛硬處

聖效透肌散

衛生寶鑑

治小兒妳癖食癖時發寒熱咳嗽脇

下結硬

雄黃

粉霜

研各二錢半

輕粉

一字半另研

海金沙

字一硃砂

另研豆蔻

穿山甲

炮

當歸

蒺藜

各二錢

荊芥

桑

茵
各三錢

右藥十一味揀淨除輕粉粉霜另研為極細末再入

輕粉等三味拌勻令將獨窠蒜去皮研如泥入頭醋和如稀糊然後調藥如膏約癖積大小攤在紙上貼於病處用新綿一葉覆其上以三褙緊繫之待一二時辰覺痛無妨口鼻內蒜香為度其功效不可具述癖消為度趙姑年十三歲癖積甚大以至危篤貼之得效如神

香蜜散治小兒妳癖不消心腹脹硬

石燕子

一枝

丁香

膩粉

別研

蜜陀僧

三味各半兩

大鼈子

去殼

一兩

右件為細末每服一錢溫米飲調下乳食後空心服

又方治小兒妳癖

華陀中藏經方

右以白芥子不拘多少研成膏攤紙花子貼痛硬處
坐中效

治小兒乳癖胸腹高喘急吐乳方

華陀中藏經方

右以不入倉黑豆七粒去皮研極細滴水七偏和成
作七丸以青黛末滾令偏更用白麴和作皮裏藥慢

火煨熟去麩再研細別入膩粉生腦子麝香各少許
再滴水丸作七丸每服一丸臨卧溫水送下兒子小
嚼破無妨極效

水銀丸

幼幼新書

治小兒啼叫不止乳母便將妳餵因被怒

氣未定為涎裏乳滯胸膈面色萎黃或時發熱吐逆
右用積聚門中三出丸藥末五七銅錢入水銀艾同
研令勻星盡為度亦醋麩糊為丸如菴豆大硃砂為
衣金銀薄荷湯下三五丸乳食後服

疰氣

附論

夫小兒疰氣者飲食不調生冷過度與臟氣相搏結聚之所成也其狀臍脇兩傍上下有物弦直大者如臂小者如指弦起急痛故名疰氣也 小兒生下五箇月日上至七歲有結癖在腹成塊如梅核大來去或似卵大常叫疼痛不住者亦分類類在左脇下痛者為疰氣下蓬莖散夾健脾散與服即愈如見面黑眼直視瀉黑血鼻口冷手足冷不進食死

方

鼈甲丸

新書 幼幼

治小兒疰氣兩脇下緊痛羸瘦

人參

去蘆頭

乾薑

炮裂

白朮

枳殼

麩炒微黃去瓢

柴胡

去苗

鼈甲

醋炙黃去裙襴

荆三稜

微煨

川大黃

剉碎微炒各一分

當歸

剉微炒

赤芍藥

陳橘皮

浸去白瓢焙

厚朴

去粗皮塗薑汁炙香熟各

兩半

右為細末煉蜜和丸菜豆大每服以生薑湯下七丸

日三服量兒大小加減服之

荆三稜散治小兒疰氣急痛

荆三稜

微煨 剉

枳殼

麩炒黃 去瓢

大腹子

鼈甲

醋炙黃 去裙襖

神麴

微炒

訶梨勒皮

蓬莪茂

麥蘖

微炒 今

厚朴

去粗

皮薑汁 炙黃

青橘皮

浸去白瓢 焙各一分

黑三稜

半兩 剉

右為細散以粥飲調下半錢日三服更量兒大小加

減服之

當歸防葵丸治小兒疰氣不能下食肌體瘦

方見本門 癖氣類

鼈甲大黃丸

聖惠方

治小兒疰氣食不消化四肢瘦弱

鼈甲

醋炙黃
去裙襴

川大黃

剉研
微炒

荆三稜

微煨剉
各半兩

枳殼

炒

微黃
去熟

芫荽

桔梗

去蘆
頭

赤茯苓

赤芍藥

乾薑

炮裂
剉

桂心

各一
分

右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五九日

三服量兒大小增減

大黃散

新書
切切

治小兒瘰癧氣發即緊痛不欲食

川大黃

剉碎
微炒

鼈甲

各一兩
醋炙
黃去裙襴

麝香

細研

木香

各一
分

荆三稜

微煨
剉

檳榔

甘草

炙各
半兩

右為細散研令勻每服以粥飲調下半錢日三四服
更量兒大小以意加減

七味鼈甲丸治小兒疰氣發即腹痛不食黃瘦

方見本門癖氣

類

蓬莪茂散

幼幼新書

治小兒疰氣一切氣疾

蓬莪茂

青橘皮

去白瓢

益智

各半兩

木香

一分糯米

一兩

右為末每服一大錢用陳米飲調下日進四服

又方

幼幼新書

治小兒疰氣食不消化四肢瘦弱

荆三稜

一兩 微煨剉

鼈甲

三分 醋炙黃去裙襴

山甲

剉碎 微炒

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓分二服溫下晚後再服量兒大小以意加減

又方

幼幼新書

用鼈甲一枚塗醋炙令黃去裙襴為細末每服一錢以童子小便一小盞煎至五分量兒大小加減服之日三服神效

痞結

附論

夫小兒痞結候結者塞也小兒胸膈實腹內有留食致令榮衛痞塞臟腑之氣不得宣通其病腹內氣結脹滿或時壯熱是也

方

曾青丸

切切新書

治小兒八痞一當心下堅痛大如小杯名

蒸痞曾青主之二如板起於脇下槍心名蛇痞龍骨主之三夾臍如手名魚痞龜甲主之四繞臍腹雷鳴名寒痞乾薑主之五當心如杯不可搖動名蠱痞牡

丹主之六心下如盤名氣痞鼈甲主之七生於寒熱
腰胸痛狀如瘡名血痞廣蟲主之八膿出腹痛中名
風痞蜚蠊主之

曾青 乾薑 廣蟲 紫石英 牡丹去心 桂心各

分 大黃 龍骨各五 蜀漆七 龜甲一云 真珠 蜚

蠊各三 細辛六 附子四分

右為末視上所說依病所主皆倍藥分煉蜜丸如桐
子大空心服四九此是五六歲兒所服若小兒所服

量之日三服九子大小量兒與之服微瀉勿怪腹中諸病皆出忌猪菜魚物據上八說疑別有鼈甲並用也

五參丸

幼幼新書

治小兒脇下有痞手足煩熱

人參

苦參

丹參

沙參

玄參

防風

各一兩

乾薑

附子

各半兩炮

廣蟲

五箇炙

大黃

四兩蒸過三升米下

蜀椒

一合 去汗巴豆

二十箇去

度心炒

葶藶

一合炒

右為末別研巴豆和勻杵萬下蜜丸如小豆大一歲

兒一九日再消減九數

硝石九

新書 幼幼

治小兒腹內痞結妨悶

硝石

柴胡

去苗

川大黃

劉碎 微炒

黃芩

各半 兩

細辛

洗去苗土

當歸

微炒

茯苓

赤芍藥

甘遂

煨微黃

木香

甜葶

麝

隔布炒令紫色各一分

巴豆

去皮心紙裏壓去油

右為末都研令勻煉蜜和丸如菉豆大每服一歲兒

一九二歲二九三歲三九四五歲兒五九並空心以

粥飲下快利為度若未利明旦再服量兒虛實以意

加減

鷄骨丸

新書 治小兒先得寒熱腹堅牢強痞不能飲食

治小兒先得寒熱腹堅牢強痞不能飲食

不生肌肉時若壯熱

芎藭 當歸 紫苑 大黃

茯苓

各三分

杏仁

去皮

尖桂心

各四分

杜蘅

白芷

石膏

各二分

半夏

一分洗

黃雌鷄

一箇破腹勿令中水去肉取兩脇翼及脰骨乾之炙令黃色

右為末蜜丸如小豆大每服二九日進三服稍加之

鼈甲足丸

新書 治少小裏急脇下支堅

治少小裏急脇下支堅

鼈頭足

一具酒二升
浸一宿炙乾

蟻螯

四十箇

麝蟲

二合去
頭足羽

炸蟬

蜣螂

各炙二
十箇

乾薑

人參

各三
兩

雲母

煉

川芎

各二

兩

牛黃

一分桂心二
兩

右為末煉蜜為丸如小豆大二九日再服

牛黃丸治小兒腹內痞結多驚

牛黃

麝香

各細
研

甘遂

煨微黃
各一分

巴豆霜

半

川椒

去
目

及閉口者炒
去汗一分

蜈蚣

十一枚去
足炙令焦

炸蟬

七枚
微炒

川芒硝

真珠

末

雄黃

細研各
半兩

右為末同研令勻用煉成蜜一合入白蠟一兩合煎
令鎔和丸如麻子每服以粥飲下二丸以利為度未
利再服看兒大小以意加減

豆蔻草果飲子

活幼口議

治小兒痞氣未結重復取利致令

虛乏腹肚疴痛不思飲食面目虛浮強食嘔吐宜服

肉豆蔻

一箇
煨

草果

檳榔

各一箇

綿黃芪

蜜炙

白茯苓

白芍藥

白朮

炙

甘草

炙

陳皮

各二錢

半夏麴

一錢

右咬咀每服二錢生薑三小片烏梅半箇棗子一箇

用藤紙包裹蘸濕煨令香熟去紙用水一小盞煎至半盞去滓通口空心食前服兩滓并煎兼與小沉香煎九服之一方無半夏麴

肉豆蔻散

聖惠方

治小兒胸中有寒乳哺不消腹中痞滿

氣逆不能乳食

肉豆蔻

去殼

人參

去蘆

藿香

白茯苓

白朮

木香

甘草

炙各一分

厚朴

姜汁炙熟

訶梨勒

炮各半兩

乾薑

炮

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服

日三服量兒大小加減服之

柴胡散

幼幼新書

治小兒腹內痞結身體壯熱中焦壅悶腸

胃不利

柴胡

去苗

赤茯苓

芳薷

鼈甲

醋炙黃去裙襴

枳殼

麩炒黃

去瓢赤芍藥

桃仁

浸去皮尖雙仁麩炒微黃

檳榔

各半兩

甘草

炙一

分

右搗粗羅為末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日三服更量兒大小加減服之

大腹皮散

新書 幼幼

治小兒腹內痞結壯熱增寒大小便不

利

大腹皮

剉

陳橘皮

浸去白 瓢焙

桔梗

去蘆 頭

鼈甲

醋炙黃 去裙襴

各三分

人參

去蘆 頭

赤芍藥

川大黃

剉微 炒

木通

各半 兩

甘草

炙一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去

滓看兒大小加減服之

檳榔散

新書 幼幼

治小兒腹內痞結壯熱不能乳食心胸煩

壅

檳榔

大黃

劉微炒各半兩

枳殼

麩炒微黃去瓢

人參

柴胡

各去

蘆頭知母

赤芍藥

地骨皮

甘草

炙各一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服量兒大小分減服之

前胡散

一名前朴散出聖惠方

治小兒胸中寒氣結塞不通時

欲嘔吐瀉泄腹脹時痛驚悸

前胡

去蘆

白朮

人參

去蘆

陳皮

去白

高良薑

藿香

厚朴

薑汁炒
各一分

甘草

炙半
錢

右為散每服一錢以水一小盞煎至八分去滓不計時候溫服大小以意加減

前胡散

幼幼
新書

治小兒腹內痞結壯熱羸瘦多啼

前胡

去蘆
頭

川大黃

剉微炒
各三分

枳殼

麩炒微
黃去瓢

赤茯苓

犀角

屑

郁李仁

浸去皮
微炒

鼈甲

醋炙黃去裙
爛各半兩

右為粗散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓服看兒大小分減微利為度

大鼈頭足九

幼幼新書

治小兒脇下積氣羸瘦骨立圕便不

節

鼈頭足

一具酒浸一宿令炙黃

乾漆

二分炒

紫苑

芍藥

人

參

菰蘇根

各三分

甘草

四分

右為末蜜和丸如胡豆大每一丸日進三服鼈截去

頭取領下一段足取腕前一段

小兒痞方

幼幼新書

白丁香

紫丁香

各四十粒

舶上硫黃

蜜陀僧

各一

皂角
子大

五倍子

一箇

黃鷹

末炒

麝香

少許

右為末如小豆大兒瘦者粟米飲下半錢肥者大米
飲下并第七椎下兩邊灸之須齊下火烟乾蟲自出

麩片相似效

甘遂丸治小兒腹內結乳食不消化心腹刺痛

甘遂

煨令
微黃

真珠

末各
一分

黃芩

赤芍藥

杏仁

浸去
皮尖

雙仁麩
炒微黃

巴豆霜

各半
兩

右為末入杏仁巴豆霜同研令勻煉蜜和丸如麻子

大二三歲小兒空腹以溫水下二九以利為效未利再服更隨兒大小加減

甘遂散治小兒腹內痞結雖服湯得利而滯實不去心下堅滿按之輒啼內有伏熱諸候集成此疾宜服破痞除熱

甘遂

煨令微黃一分

青橘皮

浸去白瓢焙

黃芩

川大黃

剉微炒各

兩半

右搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓

溫服量兒大小分減利後以粥飯放冷補之無不作效

鼈頭丸

新書 幼幼

治小兒痞氣脇下腹滿腹中積聚堅痛

鼈頭一箇 蜜一 蟲

桃仁

炒各三分

麝一 蟲

炒三分

右為末煉蜜丸小豆大二九日進三服以利為度如不利加大黃三分

甘遂湯

楊氏家藏

治小兒服湯已得大利溫壯拆而滯實不

去心下堅痞滿不可按輒啼內有伏熱諸候集成此

疾宜破痞除熱

甘遂

甘草

炙各二分

黃芩

大黃

各四分

右以水二升破鷄子二箇和取白投水中攪令沫上吹去之內藥棗丸合為二服

又方

幼幼新書

治小兒患腹中結常壯熱

大黃

炙煙出

鼈甲

炙黃茯苓等分

右為末蜜九大豆大飲下日三服量兒加減一方用

龜甲

鷄子湯

肘後方

治小兒六七歲心腹堅痞時時寒如瘧服

紫丸六十日吐下痞乃堅以此湯一碗去惡物數升

遂愈常用之效

甘遂

七銖

甘草

炙

黃芩

各五錢

右以水二升鷄子一枚拆開出白投水中熟攪吹去
滓內藥煮取一升隨兒大小計可得下合和與之藥
無毒下痞未盡更合堅實多者加芒硝細辛半兩大
效

治小兒痞滿

幼幼新書

用三白草搗絞汁服令人吐逆除胸膈熱疾亦主瘡

及小兒痞滿投此草初生無白入夏葉端半白如粉

農人候之蒔田三葉草白便秀故謂之三白

又方

幼幼新書

除小兒痞滿閃癖

用甜藤葉搗傳之

積聚

附論

大小兒有妳積候但是吐下妳來有臭酸氣此候因兒

叫未住母將妳與喫致不消化日久停滯胃冷而至此
所治者先用丁香散調胃後下食積牛黃丸取下妳積
後下勻氣散補常服健脾散即愈食積候夜間肚微作
熱或嘔或瀉此因飲食傷飽而更睡至此所治者下食
積牛黃丸通下後用勻氣散補常服萬靈丸即愈氣積
候面黃白不進食肚微痛夭矯啼叫此因患諸般氣候
久而不安傳歸氣積至此所治者用萬靈丸勻氣散醒
脾散健脾散相夾調理即愈脾積候面如土色或滯黃

而帶虛連臍下微痛肚皮熱飲食減少纔食便言臍上
及肚中痛所食不化頭微熱此因先食硬物不然冷物
所傷在脾所治者先下青金丹取下脾中積後用勻氣
散醒脾散萬靈丸即愈虛中積候渾身微熱不思飲食
日多昏昧抱着時一似睡未覺此候多因端久泄瀉不
止而虛得此候所治者先下青金丹通盡肚中積後勻
氣醒脾散調理常服萬靈丸保童子九調理即愈實積
候大便不通風毒瘡癰喉閉赤頤喉中痰响此因兒子

生來飢猛飲食無度至有前件候所治者先用奪命散
吐下熱涎後勻氣散醒脾散常服牛黃膏鎮心丸天竺
黃散與服即愈 小兒積病可醫者凡面上虛腫者是
脾之所係脾主身之肌肉故應面故知是脾積其脾係
土土無正形故早晚浮腫不定多則早浮其睡則脾不
磨上面作腫若病後有此證則是虛中積宜用調脾消
積行氣等藥面合地卧是脾積何以合地其受積在脾
是冷積何以知之其脾好土故知在脾其冷者屬陰故

知傷冷硬食得之宜下食積氣藥兒腹脹其積在肺何以知之其肺主於氣纔當受積其氣不調腹脹滿氣急故知在肺如腹脹先宜調氣後轉轉更宜調氣小便如油其積在心腸何以知之其積受於脾脾當轉心心不受觸則入小腸小腸是心之腑故知在心腸則節其水道小便如米泔油相似也髮黃是積氣傷心心主血脈遍蔭身毛髮被積氣所干則髮黃故知是積傷心宜下空心散及取積藥此人必時復發熱也赤白痢其積在

肺受傳大腸及有外傷冷而得何以知之其肺主西方庚辛金其色白後赤則是外邪故知肺傳大腸則為赤白痢也宜取後調氣兩眼黃赤睛青其積在肝何以知之肝主東方甲乙木色青却被積氣所干即黃赤睛青者眼屬五臟肝是其主肺若受積故令眼睛青是肝受積若傳膽其人口苦不要吃宜涼藥退之遍身虛腫其積在臟何以知之為其積曾取後被藥發動即不在臟故出皮膚之間為腫也只宜下取虛中藥積然後補之

耳多瀉白糞知受冷積在脾何以知之脾主化受冷積在脾冷滑而瀉白糞故知在脾宜先轉後熱藥補之小兒積病不可醫者六喘急是肺積肺主氣其喘急則肺絕其人當面白全無血色故不可醫也面黑是腎積其人面黑者是腎絕也人當不辨好惡眼直無光只得一日而死也吐熱氣是滯積其不醫者是血絕不可治也血主心心不能管故出熱氣不治耳手脚心生瘡是衛積衛者氣也胃氣不生故手足生瘡若衛絕則氣

不回只得半日也惡心乾嘔是胃積何以不醫胃主化
食胃絕則惡吐故不治其人必食乳不化不食亦乾吐
嘔面色青黃無血色也瀉久住又瀉是積咬脾爛何以
知其脾爛其人當瀉白糞為食不消住了却放糞赤黑
而死即知脾爛不可治 積病口中氣溫面黃白目無
精光或白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積宜
消積丸甚者當白餅子下之以和胃 小兒五積為臟
氣不行蓄積一處不動故曰積夫心為伏梁在臍上上

攻其心下攻胃口脾為痞氣在胃口上橫之肝為肥氣
在臍之左邊肺為息賁在臍之右畔腎為賁屯在臍下
各有變動非食之所成乃氣積也臟屬陰故在一處而
不動也小兒有聚謂六腑之氣留聚也腑屬陽陽氣運
轉不停故其聚不定一處發兒腹痛積聚之皆候面黃
瘦劣𦘔𦘔不生肌肉髮立或肌體浮腫及腹多困多為
水氣 凡驚中虛積者謂因驚發動是也所下糞青穢
凡虛中有積者因傷食而瀉又吐如此漸虛中之積有

積而頻頻取轉不着致其積尚伏故亦曰虛中積若驚
積取下則糞隨驚青如是實積即糞成塊子凡疳中虛
積者因疳病轉瀉虛而疳不退故虛中爾所取下糞裏
白色也 小兒八種積病多吐多瀉多困多熱是也面
腫手脚腫是虛中有積腹脹不思飲食是胃中有積合
面吃土炭痢痛大腹中有積面多黑困眼不開脾中有
積小便似油脚手腫腎臟中有積渴瀉不止膀胱中有
積腹內虛鳴小便赤黃小腸中有積多吐逆不吃食上

膈中有積渾身虛腫者脾之有積久取不下號曰虛中
積光塌氣候取之肚腫四肢黃色者受水氣須取之水
小便如泔肝臟受積此後用取之頭髮黃色者疴勞候
欲發此背之積用取之睛黃鼻出水者肺有積乃風疴
之候當取之赤白滯痢者此臟腑內久積用取之腸內
虛鳴者此氣蟲之候用取之吐逆或日近及氣酸臭可
取若已久不可遽取恐作慢脾且調理合地而卧此疴
蟲攢心用取之也小兒積病其脉沉實積者小兒忍食

毒食瓜桃李菓肥滑黏膩之物蘊成積聚若小兒肥實
宜與葱湯丸取次銀白散補之 小兒積病其脉洪大
下黑血形瘦行不坐久患積腹急如鼓項軟四肢冷口
噤者不食並是死候積有虛有實木香丸虛者少與之
實者倍用之 小兒消積多用青皮然青皮最能發汗
有汗者勿與之 凡有積滯須辨虛實虛則補之實則
取之古方不問四季令服四味大黃飲子錢氏論小兒
當服紫霜丸二者俱不可用况孩兒肥瘦不同長短不

同孩兒黑白亦自不同南北方之地不同而又況古今不同豈可一槩而論也大法實者可服進食九虛肥白者及疳瘦孩兒宜服肥兒九 風積者眼白青孩子壯熱形瘦也疳疾者眼黃肚急大便無禁食積者能食不生肌但腹大耳妳積者乳食過多少時必哭多即嘔吐壯熱是也驚積者大便青眼亦青夜啼宜用妙香九取大抵取積之法只用巴豆膩粉藥或宣取藥皆可量兒虛實大小壯者一歲五六丸虛者三四丸用鷄子一枚

筋頭扎一竅入藥於內塞之煮熟空心連藥與兒吃盡
良久取下積臭穢之物只白粥補之此余嘗用取積之
藥却以鷄子引入於脾其積取盡予至溫補之食大能
溫益脾產婦吃此可謂良也藥取而食補也

方

五精丸治一切食積乳積痢此藥內有溫胃補脾理氣
之劑不損胃氣有積則痢積去則止凡治積痢先服
之以去其積

縮砂仁

錢五

木香

錢二

丁香

錢二

肉豆蔻

三箇

麩

大麩餅

生

三稜

煨

莪朮

煨

白茯苓

去皮各

膩粉

二錢

人參

去

蘆

生

頭

白朮

代赭石

火燒醋淬

各三錢

白薑

炮二

麥芽

三錢

生

百草霜

一錢

巴豆

三錢

去殼

紙槌去油

右除巴豆膩粉另研餘味各製為細末再入巴豆百

草霜拌勻搗飯為丸大小隨意空心白湯吞下五更

服如取積未動早晨再一服乳飯放遲溫食免藥食

相忤吐逆惡心如止痢食白粥即止湯氏方取虛中

積以熟鷄子黃和丸在內與兒食之蓋藥取積而食
補

消積飲治脾胃虛冷不能消化乳食致成積痢及治冷
氣疝虛癰虛積吐利常服調脾進食

縮砂仁

五錢

陳皮

去白三錢

良薑

油炒二錢

丁香

粉草

炙各三錢

茴香

炒三錢

香附子

炒去毛

麥芽

生

三稜

炮

蒼朮

米泔浸各

三錢
義朮

炮

厚朴

薑汁炒

青皮

炒去瓢

枳殼

煨槌油

大麴餅

生各

三錢

右為細末米湯調入燒鹽空心服或冬瓜仁湯下虛
中積米湯調下五積丸磨化積滯將巴豆去殼炒藥
料仍去巴豆久癖用硃砂厚朴治冷氣加白薑治疝
木饅茴香湯入生鹽下

消積丸

白薑

炮

肉豆蔻

麩裏煨
一兩

枳殼

炮去
油

三稜

炮

莪朮

炮

薑黃

炮

萆澄茄

各五
錢

百草霜

微
炒

陳皮

去
白

粉草

炙

大

黃餅

生各
三錢

巴豆

五十粒
去油

杏仁

五十粒
去皮尖

青油

半
兩

右除巴杏另研外餘為細末如巴杏均勻以清油鎔蠟化開入藥末搗千百杵令勻作一蠟櫃丸合收臨用旋丸空心薑湯下一云凡用蠟丸取其入於腸臟消化積也

百當膏治一切積聚心腹疼痛年月深久者皆治之百歲至一歲皆可服

丹砂

研

膩粉

黃蠟

各半兩

水銀

陽起石

研

粉霜

研

蠟稍

炒末

鉛

同水銀炒結成砂子

牛黃

鉛霜

研

龍腦

各二錢

巴

豆

肥者二十粒去皮心膜研出油取霜

半夏

一錢湯浸七次搗羅為細末

右件令研極勻鎔蠟并熟蜜少許同和成膏旋如桐子小兒如黍米大每服三九至五九量大小虛實加減吐逆藿香湯下取熱積生薑蜜水下取冷積乳香湯下風涎薄荷湯下便利米湯下

磨積丸

瑞竹堂

治疳積泄瀉

荆三稜

蓬莪朮

陳皮

青皮

神麴

麥芽

欝金 胡黃連

雷丸

白者

史君子

肉

蘆薈

已上各等分

香附

同三稜莪朮青皮陳皮五件一處好米醋煮一晝夜焙乾用

右為細末米醋為丸如菜豆大每服三十丸糯米湯下虛弱加木香虛極加附子疳極加癩蚘蛻肉

蘆薈丸

幼幼新書

治驚疳積滯或渴或瀉或熱

蘆薈

一錢先分二鉢內研

史君子

不出皮殼

蕪荑

半錢去皮取仁

檳榔

一箇

胡黃連

沉香

木香

各一錢

麝香

少許

龍膽草

硃

砂

各半錢

夜明砂

二錢

右焙乾末用醋膽丸如桐子大每服十粒米飲下常

服妙

龍虎丹

新書 幼幼

療虛中積泄痢腹痛後重

硃砂

膩粉

炒粉霜

炒礞砂

白丁香

枯礬

各炒

一錢定粉

炒二錢黃丹

硝石

硃砂

各炒半錢

右研勻蒸餅水浸和丸如櫻桃大人每服二丸小

兒一丸米飲下

調中檳榔丸

聖濟總錄

治小兒食疳長肌膚益顏色化宿食

治腹脹破積聚和氣

檳榔 丹砂研 阿魏麵裹煨熱 代赭石 乳香研 木香

五靈脂

炒

肉豆蔻

巴豆

去皮心膜出油盡半兩

蟾頭

一枚炙焦

右研勻細麪和丸如黍米大每服二九生薑湯下更量兒大小加減一方有麝香

妙香丸治小兒虛中積潮發寒熱心腹脹滿疼痛

辰砂

一兩

牛黃

生龍腦

麝香

各一分

金箔

十四片

粉

霜

膩粉

各一錢

蠟

二兩

巴豆

一百二十箇肥者

右丸如彈子大量虛實加減龍腦漿水下夜半後服

臟虛即以龍腦米飲下每服三丸如小豆大欲藥勢
緩即按令扁疾堅者加至十九皆以針作數孔以行
藥力小兒取積如萊豆大治小兒吐逆尤效此藥最
下胸中煩及虛積

紫霜丸

幼幼新書

治消渴去積

代赭石

木香

煨

乳香

肉桂

杏仁

去皮尖

丁香

各一錢

陳皮

一錢半去白

肉豆蔻

一箇炮

右為末煮麪糊丸如萊豆大每服七丸飯飲下

惺惺丸

幼幼新書

治小兒疳勞黃瘦虛中伏積久患赤白痢

但是虛中伏積宜用此藥

陽起石

輕粉

粉霜

黃鷹條

白丁香

各一錢

硃砂

一錢半

硃砂

一錢

水銀

砂一錢

石燕

一箇火煨五次浸淬五度

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服七丸至十

五丸用火煨皂角葱白湯下非時服不動臟腑

蠟丸

幼幼新書

治一切積滯瀉痢或累經取轉氣已虛為

病未去者大人小兒並宜服之

硃砂

粉霜

辰砂

並研膩粉

各一分

川烏頭

去皮生用一兩

半取

青橘皮

末去白取一兩

黑牽牛

取粉一兩

巴豆

肥者一兩去心膜用

鹽四兩同炒乾至紫色去鹽不用又生巴豆去皮乾稱一分去心膜與炒熟巴豆同研極細入前件

衆藥末再

同研勻

右藥末每一兩用黃蠟二兩先消作汁次投藥末攪

令極勻放溫九如桐子大每服量人虛實五粒如藥

經年加至十粒七粒小兒虛積潮熱寒熱亦與服菜

豆大三粒並生薑木瓜湯下夜卧服凡有冷積胸膈

不利先吃一服冷瀉不止或赤白痢尤宜服藥即愈
如痢甚者三更初一服次日更一服立效

真珠丸治小兒久積驚疳退積滯化風涎利膈

真珠

末

巴豆霜

去油

滑石

各一分

半夏

三分薑浸七次

續隨子

仁三分白附子

半兩

寒食麪

二分

天南星

半兩薑浸七次

右末滴水丸如桐子大每服二歲者一二丸加減用
葱白湯下疳疾史君子湯下

木香丸治乳積食積氣積

木香 蓬莪朮 縮砂仁 青皮去白 硃砂研細 代赭

石研各二錢 大丁香一錢 川巴豆紙壓出油一錢

右為細末和勻飛羅麪糊丸麻子大風乾每服二三九乳傷乳汁下食傷米飲下後與大異香散或和劑

異香散亦得氣積橘皮煎湯下後與和劑流氣飲

異香散取積後調理

石蓮肉一兩 蓬莪朮 益智仁 荊三稜 甘草各六

兩 青皮去白 陳皮去白 厚朴薑汁炒

三兩

二兩

右判散每服二錢水一盞生薑二片棗二枚鹽少許
煎通口服鹽酒調亦可不拘時服

消食丸化積滯

香附子

一兩

縮砂仁

一兩

橘皮

甘草

炙

神麴

炒

麥芽

炒

三稜

炒

莪朮

炒各

半兩

右為末化蒸餅為丸如黍米大食後溫水下一歲十

九加減

曾青丸療大人小兒久寒積聚留飲宿食天行傷寒者

服之二十日愈久服令人延年益壽治仲堪云扁鵲
曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消渴
隨病所在久病羸瘦老小宜服此藥或吐或下或汗
出

曾青

朴硝

各二分

茯苓

寒水石

附子

炮各三分

巴

豆

二分去
皮心炒

大黃

分

右搗下篩巴豆硝石合搗六千杵次內附子搗相得
次內茯苓搗相得次內大黃搗相得次內曾青搗相

得次內寒水石搗相得次內蜜和搗千杵大人服如
大豆小兒五歲已下如麻子大一丸二三歲兒如黍
米大一丸如服藥以薄荷粉粥清下當服卧令汗出
吐下氣發作服二丸霍亂服三丸泄瀉不止服一丸
可至二九一方用曾青三分忌豬肉冷水蘆笋大酢
七宣丸療風氣結聚宿食不消兼沙石皮毛在腹中及
積年腰痛冷如冰石脚氣衝心煩憤悶亂頭旋眼暗
肩背重悶心腹脹滿胸膈不開寒風毒氣連及頭面

大便或秘小便時澀胃氣痞結不能飲食腿脚轉筋
掣痛攣急心神恍惚眠寢不安等疾

大黃

濕紙裏煨
十五兩

桃仁

去皮尖
炒六兩

枳實

炮

木香

柴胡

去苗
洗

訶梨勒皮

各五
兩

甘草

炙四
兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九粒飲下食
後或臨卧服稍增至四十粒取宣利為度量虛實加
減覺病勢退即服五補丸不問男女老少並可服量
方加減

青金丹治小兒諸積病

滑石

末

白丁香

羅過

天南星

各二錢七

青黛

羅過平錢

輕

粉

重二錢

水銀

二錢先以錫二錢於銅銚內煮鎔便以水銀拌和瀉出於地冷用

川

巴豆

去皮心膜七十二粒無缺損者并花水浸一宿懸當風處吹乾細研爛

右前件藥同拌合用軟飯為丸如桐子大巴豆不出

油依形證用湯使下項傷寒後取積淡煎葱湯吞下

取疳蟲用牛肉炙汁下驚風肚中緊硬面青黑金銀

薄荷葱湯吞下因傷看肚中及腹皮上微熱肚脹夜

間作熱似疳又不是疳面青黃色眼微黃此腹中有積用皂角子二七粒灰內煨過用水一盞煎至半盞下有積作瀉魚鮓湯下氣積炒茴香湯下凡下此藥週歲十四九三歲十八九七歲二十四九看大小加減下須是四更初下至天明通下積來盡時可依形證後下藥補之臨吃此藥恐先吐下痰涎不妨

軟金丸治驚疳下積聚

青黛 膩粉

胡黃連

麝香

各一分

寒食麪

三錢 史

君子

三箇

天漿子

三七箇

石研勻滴水九桐子大每一九用金銀薄荷湯下

三出九去積聚

陳皮

去瓢

縮砂仁

藿香

荊三稜

蓬莪朮

羌

花

各一分同醋煮乾為度

巴豆

五十粒和穀瓦上焙焦為度

右先六味為末次杵巴豆令爛與諸藥拌勻以醋麪

糊為丸如菉豆大硃砂為衣每服三五丸薄荷湯化

下乳食後服

膽礬丸治小兒脾積肌瘦

石膽礬

研

蘆薈

研各半兩

龍腦

研

麝香

研各一分

黃連末

兩

用豬膽一具入末在內以上好醋煮十餘沸出掛陝乾研末

胡黃連

末一分

右同研勻細醋煮麪糊丸如菉豆大每服十九丸晨臨卧溫米飲下更量兒大小加減

抵聖丸治下虛中積久曾取轉不得者

犀角

鎊末二錢

蠍稍

三七箇

銀末

硃砂

各一錢

芫花

二錢同已

豆用好醋二盞煮令醋盡揀出已豆以冷水浸洗控乾芫花再炒令乾搗末取二分用如法製好

巴豆

二十八枚
去皮膜

右同為細末再研如麩將巴豆別研如糊和勻以水
煮麩糊為丸如菉豆大若小兒因驚積聚黏滑毒物
在於脾累曾取下變成虛積棗湯下體熱因困眼合
不開黃連甘草薄荷桃仁湯化膩粉一字許下一歲
已上三歲已下二九小兒只可一九米飲下大人吃
食吐逆腹心脹滿夜有盜汗日漸羸瘦用薑棗湯下
婦人血氣醋湯下五七九更在臨期約其虛實加減

用之名紫金丹

萬靈丸治小兒諸積依形證用之

木香 黃連

蓬莪朮

各半

陳橘皮

青橘皮

各一

分去

檳榔

一箇重一錢
半已外者

右為末每服一錢用巴豆一粒去心膜用醋煮巴豆
一箇煮令紫色用杏仁一箇去皮尖燈火上煨留性
二味都研用醋麪糊為丸如桐子大每服五九十九
薄荷薑湯吞下

木香真珠丸治小兒虛中一切積聚驚涎宿食乳癖治
大便秘滯療腹脹行滯氣

木香

白丁香

直

丁香

末

輕粉

各半錢留少許為衣

白滑石

末二

巴豆

十四箇水浸一宿研極膩一法用小便浸

右為末研勻濕紙裹燒粟米飯九麻子大一歲一丸
八九歲已上至十五歲服八九炮皂子煎湯放冷下
扶風熱難動者先吃涼藥一服乳癖者減丸數隔日
臨卧一服

龍鬚丹取下百歲老兒及初生兒一切虛中積轉取不下日漸羸瘦

硃砂 硃砂

粉霜

膩粉

各六錢

白礬

飛

黃丹

生用

各半兩

右研勻細如粉湯浸蒸餅丸龍眼核大量虛實加減大人一兩九臨卧陳米飲下嚙下飲兒半九此藥有積則化無積不動小兒半粒分九

紫金丹治下膈取虛積沉積逐風涎

鉄粉

真者一分

白丁香

膩粉

硃砂

無石者

粉霜

各一錢

巴豆

六十粒去皮膜留油

右研勻用黃蠟淨者半兩銀器內重湯煮開入藥拌勻取出放冷作劑旋丸小豆大打扁每服二粒棗一箇細裏藥吞下臨卧服並不可搜攪亦不可動氣利看虛實臨時加減小兒亦可服

檳榔散治小兒積食疳氣肚脹等候

甘草

炙

木香

各一分麪裏煨候麪色黃去麪

檳榔

兩箇生對

青橘皮

去白

半 兩 陳米 半合用巴豆二十五粒去殼合炒香熟去巴豆用米 巴豆 二十粒去殼同青皮

炒半時辰慢火炒去巴豆只用青皮

右為末每服半錢或一字葱湯調下服後溏利下則

瘥

桃符丸取驚積

硃砂 天麻 末 鉛白霜 各半錢 輕粉 二錢 水銀 皂子大 巴

豆 三粒去皮膜

右為末飛羅麴滴水如桐子大驚候壯熱或吐或瀉

脉沉緩眼色困此是驚積週歲以下五九桃符湯下
加減服之

睡驚散治鎮心取積

藟金

半兩

辰砂

半錢

麝香

乳香

各一字

陳皮

二兩去白用一分

巴豆

十四粒同藟金炒熟不用巴豆

右為末每服一字看大小加減薄荷湯下

勝金餅子治虛中積

粉霜

延胡索

巴豆霜

各半錢

輕粉

一錢

硃砂

一塊

大石燕一箇

右為末冷水為餅子如桐子大每服一九皂子湯下

大小加減

太碧丹治水癖食癖五積果子毒但是腹中疾並治乳積不消四季服之

光明砂二錢滑石二錢膩粉二錢舶上硫黃各一錢鷹糞各一錢

小巴豆七粒斑者去心膜水浸一宿洗七度研如泥去油

右為末同研勻入巴豆膏浸煎紅米飯為丸菴豆大

青黛為衣半週一九一歲二九量兒大小加減用之
春冬煨皂角湯秋夏煎蘿蔔湯下如驚煎金銀薄荷
湯下

三稜散治積氣肚疼

益智

炒去殼

三稜

莪朮

青皮

炒

縮砂仁

甘草

炙

右等分為散每服白湯下

草豆蔻散治小兒胸中寒氣積滯氣逆不下乳食

草豆蔻

二枚 去皮

檳榔

一分 訶梨勒

半兩 煨用皮

人參

前胡

去蘆各

甘草

半分 炙

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時溫服更量大小加減

鎮心丸

訶曰小兒心硬辨應難撞肋衝胸有數般忽

即當心一片硬不然分作兩邊安丁香牛黃石膏共天竺生犀九作丹更入茯苓并枳殼頻服三粒必心寬

丁香

分半

天竺黃

石膏

分各一

生犀

錢末一

牛黃

許少

右為末蜜丸如菉豆大每服二粒春夏枳殼湯下秋

冬茯苓湯下

雙九子治小兒結實不散乳食不消心腹痛

太山甘遂

炒

牛黃

分各二

真珠

分一

杏仁

湯去皮去

芍藥

各四

分

右為末蜜丸麻子大一歲兒米飲下二九量兒加減

柴胡飲治小兒自下後得寒熱血結成癖氣在左脇下

或寒飲或冷食積聚氣動胸心留熱不下飲食閤瘦
宜先服此飲子散氣下食後服紫霜丸去宿積自充

溢也

紫霜丸見
本類前

柴胡 茯苓 人參 白朮 鼈甲

醋塗炙香
熟各二兩

右切如棗豆大水二升煮五合空心溫服三四服相
去如人行一二里久再服以粥將息

北亭丸治小兒積聚黃瘦吐食

北亭 馬牙硝

硃砂

末各一錢

膩粉

錢一

巴豆

六十箇
去殼細

研出
油

右研勻餅劑中裏之煨令熟去餅硬者留少許潤者
滴水為丸如菴豆大荊芥湯下一歲一丸

白芷散治小兒瘡癬虛中積及妳癖等候

白芷 硫黃 蜜陀僧

各半兩

母丁香 白丁香

各三

五粒

右為末每服半錢煎麪湯調下未發時一服取下黑
物不用服補藥發時一服如用補只煎醋石榴皮湯

與吃日二服逐日下黑物為效忌鷄魚果子乳母亦

忌

乳香丸取小兒一切積累用藥取不下腹脹瀉痢頻併

乳香 硃砂

沒藥

各一塊
皂子大

芥菜子

四十粒

巴豆

一粒

生

右為末大棗一枚裏濕紙重封灰火內炮熟取出去
紙與棗子肉乳鉢內研為膏若不通研入少許飛羅
麪丸如菜豆大每服七丸週歲三丸五更用淡湯下

取下元傷物

硃砂丸治小兒驚熱乳食積聚不消

硃砂

膩粉

麝香

雄黃

各半分

巴豆

七粒去皮去油

右為末蜜丸如粟米大一歲一九荆芥湯下大小加

減

下積丸治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或瀉嘔

丁香

縮砂仁

各二箇

史君子

五箇焙

烏梅肉

焙

川巴

豆

各二箇不去油

右為末研細和勻爛飯九麻子大每三九橘皮煎湯下

三稜九治小兒脾積氣

荆三稜

剉

石三稜

剉

鷄爪三稜

剉

蓬莪茂

剉各半兩

木

香

一分

右五味並生杵羅為末煮麪糊和九如麻子大膩粉為衣每服五九烏梅生薑湯下量兒大小加減

真珠九療小兒痰實結聚宿癖羸瘦露骨不能飲食

方見

本門諸癖
結脹滿類

丹砂丸消除積滯化胃久伏積聚

巴豆

一分去皮以米醋煮一二十沸却入新水內洗七遍淨去膜并心及乳鉢內一同研如粉

去油豆蔻

四箇為末

木香

硃砂

研細各一分

右同研令細以麪糊和丸如菰菜子大每服三五丸

小兒一九酒食所傷鹽湯下溫水亦得小兒疳氣肚

脹腹滿米飲下一切氣疾生薑湯下婦人血氣當歸

酒下吐逆不止煨薑湯下咳嗽烏梅甘草湯下水瀉

新汲水下赤痢乾薑湯下白痢甘草湯下血痢沒藥湯下一切疾更酌其虛實用之

真珠丸治驚風止吐逆腹內有癥積踈臟腑

滑石

分三

天南星

錢二

膩粉

錢一

巴豆

七粒

去皮紙裏壓出油

右研為細末以糯粥為丸如黃米大若腹內有癥積

臨卧時炮皂角子煎湯下驚着用葱白湯下若有涎

吐逆用母丁香一箇煎湯下每服一九至三九量兒

大小加減

麥門冬雙九子治小兒痰實結聚

麥門冬

去心四分

薤仁

二百枚去皮膜

丹砂

三分

巴豆

四十箇去皮心炒

右為末蜜九黍米大一歲二九三二歲服麻子大四九一方用真珠不用丹砂白湯下亦可

聖餅子治一切積氣虛中積下風涎其藥取病甚穩全不搜攪時作壯熱煩渴腹臍不調

輕粉

粉霜

各四錢

石鷲子

大者二枚先為細末

延胡索

大者二十

八箇為末

右同研勻滴水和丸如菰子大仍候陰乾每服一餅
子先用熟水浸軟冷漿水調下臨卧更深服服後急
嗽口此藥只取積滯并不損氣更臨時加減若要下
驚積則每料更入硃砂生龍腦各一錢重小兒一餅
分為四服或便捏成小餅子

桃紅散治小兒驚積疳積常服進食面如桃花

馬牙硝 硃砂 茯苓 人參

等分

右為末二歲服二字一歲一字三歲亦二字四五歲

三字新汲水入蜜少許調下蜜水約盞內三分

五聖丹治一切遠年近日酒食所傷漸成積塊兼消化冷果食逐五飲服餌消積塊

大烏梅

巴豆

大者各
十箇

半夏

大者用
三十箇

丁香

新好者
五十箇

右為細末滴水丸如麻子大硃砂為衣小兒兩丸大人每服三五丸至七丸量虛實加減生薑湯下不計時候

紫金丸治小兒大人因驚積聚粘滑毒物在脾胃累曾

用藥取不下變成虛中積大人吃食吐逆心腹脹滿
夜有虛汗日漸羸瘦

蠟梢

三十箇

犀末

銀末

硃砂

各一錢

右為末極細用水麪糊為丸菴豆大用薑棗湯下七
九婦人血氣米飲下五九至七九小兒驚疳積體熱
困重目不開用黃連甘草桃仁薄荷湯化臙粉一字
許一歲以上三歲已下三九小兒只可一九二九

浮珠丸子治小兒取積

雄黃

水飛過

硃砂

細研各半錢

巴豆

五粒去油

右和勻以天南星末酒煮糊為丸小兒粟米大大人桐子大用金銀薄荷湯下加減服之

磨刀丸取小兒久因驚積滯食急慢驚風積妳不下作燥作熱作吐瀉多叫不睡

全蠍

硃砂

一錢

粉霜

二錢

半夏

湯洗七次去涎用七箇

右為末巴豆十四箇都研蜜浸蒸餅心為丸入麝香少許丸如菜豆大磨刀石水下一歲一九看虛實加

減服如吐瀉即用驚藥調理不得喫和氣散恐渾身

驚氣

取積青榴丸

幼幼新書

輕粉

炒五錢

青黛

炒三錢

腦麝

各半字重

巴豆

去心油春冬三十五粒秋

夏二十四粒

右為末麪糊丸如菉豆大每服五丸米飲化下

五珍丸治酒食積通用

青皮

去白炒焦黃

乾薑

炮存性

北五靈脂

蓬莪朮

各一兩

石為末夾和秤藥末一兩用巴豆肉以石壓准去半
油秤一錢研細拌和粟米飯九麻子大每服三五丸
米湯下飢飽時服

葱湯丸治積神效

巴豆

二十五粒用水浸一宿五更初去水後去皮殼心膜不去油另研

滑石

五錢輕

粉

半錢鷹糞五錢

右為末研飯為丸如粟米大週歲已下每用三丸以
上四丸未效再加丸數膈上有涎或吐亦無妨如有

蟲用苦楝皮少許甘草二寸煎湯五更初先將化蟲藥服了後用此取下春季燈心湯下夏季蘇鹽湯下秋季蘇湯下冬季葱白湯下初生兒以一粒放口中乳汁下

化鉄丹治小兒食積肚硬帶熱渴瀉或嘔皆因飲食無度多食過飽後即睡得之

烏梅

八箇
取肉

巴豆

十六粒
去殼

青皮

五錢
去瓢

陳皮

五錢
去白

右為末米糊丸粟米大每服七丸米飲下銅鐵亦銷

消積丸

一名丁香丸

治小兒食積口中氣溫面黃白多睡及

乳積吐乳瀉乳此由啼哭未已以乳與兒停滯不化

得之

縮砂

十二箇

丁香

九箇

烏梅

三箇

巴豆

一箇去油

右為細末糊丸如黍米大三歲已上五六九已下三

二九用溫水下無時服凡小兒身溫壯熱非變蒸之

候大便白而酸臭為胃有蓄冷宜丸藥消下後服溫

胃藥若身溫壯熱大便赤而酸臭為胃有蓄熱亦宜

丸藥消下後服涼胃藥無不愈一方用藿香湯下乳
後一方加百草霜和勻

三味紫霜丸消積聚

雄黃

三錢

硃砂

一錢

百草霜

二錢

右為細末飯丸如米大每服三五丸至十丸煎皂角
仁湯下無時兒小者減之一方巴豆七枚代赭石二
兩杏仁一錢治乳食不消炊餅和丸溫米飲下

雄黃丸治取積

雄黃

三錢

鬱金

半兩

巴豆

二十粒

去皮出油

右為末麪糊丸如蘿蔔子大加減服每五丸空心茶

清下

追魂散治果子傷積

白丁香

輕粉

官桂

去皮各三錢

右為末冷水調下半錢睡時服來日取下所傷物用
異功散煎紫蘇木瓜調湯三服和氣

木香散治小兒諸般氣積或驚結不通此藥立取下

木香

末一錢半

陳皮

二錢

巴豆

五粒去心膜

去

右將陳皮巴豆用炒黃色只取下巴豆五片餘不用與前木香末同研勻每服半錢或一字陳米飲下若吐瀉瓦缸內煎香附子湯下大小加減

青黛三聖丸治小兒痰涎隔食妳癖驚風消妳食蛔蟲疳積腹痛

青黛

一分

牽牛

末二分

膩粉

二錢

錢

右為末麪糊為丸米飲下

靈砂丹下虛中積臟腑虛滑泄瀉久經取轉裏急後重
久積惡痢暴瀉久不止神效無比

通明硃砂

一錢
細研

麝塊神砂

通明有如墻壁
者一分細研

右二味滾研極細用蠟半兩先於蓋內鎔成汁入去
皮巴豆取三七粒全者煎候巴豆紫色為度即漉出
巴豆細研入前二味再研勻於黃蠟內三分中取一
分再鎔成汁傾藥於內急攪令勻刮出於瓷合內收
之每服暴瀉惡痢旋作三九如菰豆大濃煎艾湯先

呷三五口然後吞下水瀉冷水吞下如取積每服三
九如桐子大濃煎甘草湯放冷吞下臨卧服其久積
藥隨積下其小可不動便安

飛霜丹理一切虛中積下痢膿血裏急後重臍腹撮痛

硃砂

三分去
砂石并

粉霜

三錢
并

右同研勻用薄紙拗作小紙箱子方濶二寸半深四
分許將藥末鋪在箱內冷掘了地坑深三四寸其濶
約碗蓋得着用火烧令極熱即去燼火惟留熱火三

兩挺鋪在坑底置藥箱子在內火上急用甕梔蓋坑口周回以細土壅塞無令透煙凡燒須防蓋定後火減頻以手按試梔足熱可燒時須用好熟炭火即不減燒如兩炊飯久即藥成也如火減即再裝火燒之及兩炊飯久候梔冷即開梔取出藥燒梔上有藥煙着梔處亦揩下再研令細凡藥得熟自於火上交凝更次入膩粉九錢龍腦一錢再滾研令勻水浸蒸餅心丸如菴豆大大人每服十九至十五丸乳香湯下

金匱要略卷三
卷三百九十二
小兒三五九如有積可一兩日方徐徐利下也

治小兒脾積

獨科蒜

一塊等
見分兩

香白芷

等分

右為末將蒜搗爛入臘臙脂等分同白芷蒜同搗成膏子貼小兒臍中用牛角盒兒男用上蓋覆臍女用下蓋同用然後用無粃粉絹帛勒之待小兒口鼻中出蒜氣香去藥其病自全效驗

蘇感九治小兒氣積痛啼叫利如蟬勃皆由觸忤其氣

榮衛不和去臟腑有積下利

蘇合香丸

感應丸

各等分

右和丸如粟米大紫蘇湯下二十丸一方淡薑湯空

心下

滋氣和胃消積

縮砂香附湯

平胃散

右和合每服一錢蘇鹽湯下多服尤妙

治小兒積滯腹脹食傷等疾

用芫花未開者及時採取眼瞧乾摘去枝梗用和淡
米醋或糠醋浸藥面上醋高一指隔宿取出控起帶
醋於鉚內以慢火炒之不住手攪拌水脉斷即以碗
器蓋之候冷傾出着底焦者不用洗過鉚子揩淨再
炒香熟焙乾為細末却以先浸藥醋打硬糊為丸如
粟米大每服三二十九米飲下不拘時候一時許再
進必剩一兩行即止甚易而無所損若去脾胃停滯
即用沙糖水或紫蘇湯下打糊醋須澄清者用或少

却添別醋九時更作一如菜豆大者治大人酒食所傷九數量患隨虛實服之芫花海藻甘遂大戟四者皆反甘草服此藥須忌他藥一日臟腑既動當以白粥補之

青礞石丸治小兒臟腑積聚脇肋脹硬肌肉消瘦不能飲食一應妳癖食積悉皆治之

青礞石

木香

乾薑

各一兩

荊三稜

煨切

枳殼

麩炒去穢

皂角

去皮醋炙黃去子

丁香

各半兩

巴豆

二錢半去殼出盡油取霜

右為細末煮神麴糊為丸如黍米大週歲兒每服十
九溫生薑湯送下乳哺後

三稜丸治停積不散腹肋脹滿乾噦惡心全不入食

荊三稜

煨香切

木香

神麴

炒黃

陳橘皮

去白

半夏

入生薑四

兩同搗成膏炒
令黃各一兩

右為細末煮麴糊為丸如黍米大每服二十九溫生
薑湯下乳食後

磨積渴丸

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 香附子 木香

蘿蔔子 炒 牽牛子 半生 半炒 神麴 麥蘖 檳榔 各等分

右為末糊丸如黍米大蘿蔔湯下

丁香脾積丸治一切積氣腹肚堅腹脹不進飲食

皂角 燒一箇 青皮 半兩 三稜 二兩 莪朮 三錢 丁香 半兩 砂仁 半兩

麥芽 三錢 炒 青黛 二錢 巴豆 三七粒 出油

右為末烏梅肉搗糊為丸空心飯飲下茶清亦可日

進三服丸如麻子大

三稜煎丸治虛中有積痛不進飲食

三稜

莪茂

炮各半兩

芫花

三錢三味同醋煮一夕

南木香

二錢烏

梅肉

二錢半

丁香

二錢

右為末醋糊為丸如菉豆大每服二十九飯飲吞下亦能退面目浮腫

鮓湯丸治虛中堅積外疾氣壅腹大膨脹遍身浮腫

雷丸

二錢

甘遂

二錢

粉霜

半錢

滑石

二錢

白膳玉

一錢

輕粉

半錢

芫花

少許製

青黛

三錢

水銀

少許

右為末爛飯搗成丸如菜子大未週者隨月數與之
拌碎不可喂可如雛哺若妳疳金銀薄荷湯下或葱
白湯下三歲二十九疳瘦五十九滿身浮腫毛髮黃
堅用淨洗魚鮓煎湯下疳勞腹大湯使如前一日止
可兩服不可連進五六歲常服只十五丸自然疎泄
利去滯積如未退加一二服積盡而泄自疎但吃白
粥補之不可用甘草藥調理則成相反忌甜物一月
為妙

延胡索散治氣積食積成塊及盤腹氣痛

延胡索

茴香

炒

甘草

蓬莪茂

各三錢

右咬咀每服一錢水五分煎至三分溫服如取後腸中一切冷痛並皆治之

塌氣丸治積水驚水飲水多停積於脾肢腫而熱

赤小豆

陳皮

蘿蔔子

甘草

各半兩

木香

地一錢

右為末用神麴末煮糊為丸如菉豆大每服十九薑

湯下

麻仁丸破氣消積心腹痞塞並能治之

麻仁

半兩

芍藥

八錢

大黃

一斤

枳殼

八錢

厚朴

半兩

杏仁

半兩

右為末蜜丸如菉豆大每用十九溫水吞下

外宣藥治小兒積氣腹大如吹氣塞痞滿

郁李仁

一錢

巴豆

烏梅肉

一錢

皂角

炙

桃膠

二錢

朴硝

許櫝榔

少

枳殼

各一錢

右為末煉蜜令熟入藥搗勻丸如棗核樣納入穀道

荊黃湯治氣閉不通臟腑痞結

枳殼 大黃 荊芥 朴硝 梔子 甘草

各等分

右為末每用一錢燈心湯調服立下日與兩三服

尅效聖餅子治癖積

陳皮

十兩

巴豆

百箇同陳皮炒

廣茂

炮

荊三稜

炮

香附子

半炒

兩

右為細末打麪糊為丸如菴豆大捻作餅子每服三

十丸溫水送下

橘皮丸治癖積堅硬不消

橘皮 二
巴豆

半兩
去皮

右將橘皮剉碎將巴豆炒令重黃色為度揀去巴豆
不用只搗陳皮為細末用軟飯爛研為丸如菜豆大
每服二十九溫淡生薑湯下食前量小兒歲數旋丸
大小

廣茂潰堅丸治小兒癖積脇腹脹滿發熱咳嗽喘促不
思飲食

青皮 陳皮 廣茂 木香 烏梅 三稜

炮各
一兩

大椒 巴豆

各半兩

右為細末麪糊丸如麻子大每服五七丸溫米飲下
量兒大小為丸加減服之食遠服

六味三稜丸 曠明仲云五六箇月小兒未吃食有癖
積者保安丸太重只服此六味為佳

莪朮

煨對

三稜

煨

神麪

炒

麥蘖

炒

青皮

陳皮

右等分為末水煮熟清糊為丸熟水下

丁皮散治小兒脾積疼痛有效

丁皮 白朮 茯苓 青皮 良薑 縮砂仁

神麴 麥蘖 甘草 真桂心

右等分為末燒鹽湯點服

剪紅丸

一名神應丸

磨癖積殺諸蟲進飲食神效驗無問男

子婦人小兒老幼看虛實加減服之有孕婦人不可服

乾漆

剉炒一錢

紫芫花

炒一錢

巴豆

七箇去油

斑猫

七箇去足

右為細末米醋打麴糊為丸如桐子大每服一九細

紗包紅綿繫定剪下來因此立為剪紅丸每服一九
同後藥服之

南木香 雷丸 荊三稜 百部

微炒

廣茂

生各半兩

貝

母 檳榔 大黃

各二兩

史君子

四十箇

牽牛

生半箇

右為細末外用皂角肥者一十定搥碎山茵陳一兩
對苦楝根皮二兩對水四五碗慢火砂鍋內熬至一
小碗以上藥搜和為丸如梧桐子大小兒粟米大晒
乾每服二錢半重各隨後證引子湯送下但服此藥

至五更鷄呌服之忌一切腥葷生硬蔥蒜油膩之物
此方與諸方甚異幸毋忽焉 呌呌喘急咳嗽煎桑
皮湯下 取寸白蟲煎石榴湯送下 虻蟲苗蟲沙
糖水送下 脚氣腫不能行蜜水送下 木瓜湯亦可
酒痢酒積百藥煎湯送下 大小便不通淡醋湯
送下 婦人血蠱煎葱白湯送下 婦人血脈不行淡醋
煎紅花湯送下 小兒一切諸證蜜水送下 沙糖水
亦可 腸風下血山梔子煎湯送下 食積氣塊諸

證亦用溫蜜水湯茶湯送下

傷飽

附論

夫小兒傷飽候小兒食不用過飽飽則傷脾脾傷不能磨消食也今小兒四肢沉重身體苦熱面黃腹大是也又小兒食不知飽候小兒有嗜食食已仍不知飽足又不生肌肉其小腹大大便數而多泄亦呼為豁治此腸胃不守故也

方

檳榔散治小兒傷飽太過脾氣消壅面色赤黃手足俱熱心腹脹悶

檳榔

枳殼

炒微黃

人參

去蘆

川大黃

各半兩

赤茯苓

神麴

炒微黃

陳橘皮

湯浸去白

甘草

炙

麥蘖

各一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許葱白二寸煎至五分去滓溫服日三四服更量兒大小以意加減服之

前胡散治小兒傷飽心腹滯悶不能乳哺

前胡 檳榔 川大黃微炒 枳殼麩炒 赤茯苓 沉

香各半 訶梨勒三分 木香 甘草各一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓溫服日三四服更量兒大小以意加減

赤芍藥丸治小兒傷飽心腹妨悶脇下或痛

赤芍藥 柴胡去苗 赤茯苓 訶梨勒皮 檳榔各半

兩 川大黃剉 鼈甲各三分 桂心 木香各一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五九日
三四服更量兒大小以意加減

大黃丸治少小傷食苦飽卧失衣當風居濕地其為證
腹大膨脹時泄困甚如寒熱壯又或如霍亂動作時
痢腹出膿血

大黃 苦參 桔梗 杏仁 芎藭 半夏洗 黃

芩各三分 葶四分

右為末蜜丸如小豆大一九日進三服白湯下

半夏散治小兒吃食太多傷脾即不食吐逆

半夏

二分生

黃葵子

防風

遠志

款冬花

桂

心

前胡

乾薑

各一兩

右並搗為散空心米飲下一錢立效乳母不可服

芍藥丸療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母飲食粗惡心苦乳汁不起兒乳不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢痿癭繚戾服之令充悅

芍藥

錢一

黃耆

鼈甲

炙

人參

兩

各四

柴胡

八分

茯苓

六分

甘草

乾薑

各三分

右搗篩蜜丸如豆大每服五丸日二服忌如常法一方有大黃無黃芪云服一九一歲以上乳服三九七歲兒服十九二服

芍藥丸治傷飽羸瘦不生肌肉乳食不化

芍藥

七分

柴胡

四分

大黃

三分

桂心

一分

茯苓

乾薑

鼈

甲

各二分

右為末蜜丸一歲兒先哺乳吞小豆大三九日三服

木香丸治小兒乳食過度腹中脹滿

木香

鼈甲

醋炙黃

牽牛子

微炒

川大黃

各半兩

赤茯苓

分一

右搗細羅為末每服以溫漿水調下半錢晚後再服
更看兒大小以意增減

調胃丸治小兒脾疾腹虛等證

丁香

半夏

各四十箇

巴豆

胡椒


各四十箇

右為細末棗肉為劑入臼中杵一千五百下為度如

粟米大隨湯水送下食後每服一九如胸膈不和生
薑湯下如脾疾皂子湯下如喘嗽桑白皮湯下

治小兒食不知飢飽

用鼠屎二七粒燒為末服之



普濟方卷三百九十二